


Bs Phạm Thị Trà -

Tóm tắt:

Ung thư và cách điều trị có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của bệnh nhân. Các bác sĩ lâm sàng điều trị bệnh nhân ung thư cần nhận thức được đa mô thức điều trị có sẵn để giảm thiểu mức độ bệnh và xử lý ung thư do bệnh di căn và giảm thiểu tác dụng phụ do điều trị ung thư gây ra cho bệnh nhân bình thường.

Bệnh di căn ung thư thường gặp nhất với các loại ung thư vú (70%), tuyến tiền liệt (85%), phổi (40%) và thận (40%) cũng như đa u tủy xương (MM) (95%). Di căn ung thư thường ảnh hưởng nhất đến khung xương trực và thường gây ra các biến chứng được gọi là các biến chứng liên quan đến ung thư (skeletal-related events:SREs): gãy xương bệnh lý, xương gãy, phù nề, chèn ép tủy sống (spinal cord compression: SCC) và tăng canxi máu, nhưng biến chứng trên cũng có thể xảy ra mà không có di căn ung thư. Xương gãy và gãy xương là SREs phổ biến nhất, phù nề ảnh hưởng đến đau xương và tác dụng phụ của thuốc do di căn gây ra. SRE có liên quan đến việc mất khả năng vận động và hoạt động xã hội, giảm chất lượng cuộc sống (QoL), tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và khả năng sống sót kém hơn.



[Xem tiếp tại đây](#)