

Ths Lê TĐ Đỉnh - Khoa ICU

“Trong số những bệnh nhân điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) với giãy dụa tích cực hoàn điều trị bằng dịch keo so sánh với dịch tinh thể cho thấy có ít hơn vong thương tửu sau 28 ngày điều trị”. Đây là kết quả của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, đa trung tâm được đăng trên tạp chí JAMA được công bố trực tuyến ngày 09/10/2013.

“Mặc dù mục tiêu là số lượng dịch truyền tĩnh mạch để bù đắp thể tích khu vực nội bào, dịch truyền cũng di chuyển vào khoang gian bào”. Tiến sĩ y khoa Djillali Annane và cộng sự, làm việc tại bệnh viện Raymond Poincare vùng Garches, cộng hòa Pháp cho biết từ kết quả của thử nghiệm “Trên lưu lượng bằng dịch keo so sánh với dịch tinh thể trong hội chứng bệnh nhân điều trị tại các khoa ICU”.

“Dịch tinh thể được cho là có nguy cơ ngăn cản sự di chuyển theo đường áp lực thẩm thấu bởi các chất hòa tan, trong khi dịch keo mục đích khai thác sự chênh lệch áp lực keo khi u khi u cho kết quả thương tửu”.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2013 20:55 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 11 2013 15:04

