

Paraphimosis

Viết bởi Biên tập viên


Thứ hai, 25 Tháng 11 2013 08:15 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 20:27

Bs. Thạc y Châu Quý, Bs. Phạm Thanh Tùng - Khoa Ngoại tổng hợp

I. Định nghĩa:

Paraphimosis là tình trạng da quy đầu tút lên khi quy đầu nhúng không tút xuống được. Đây là tình trạng cấp cứu niệu khoa.

Khác với phimosis - là không bao giờ tút được da quy đầu khi quy đầu.



II. Nguyên nhân:

Thường xuyên nhét là do điểu trị xãy ra sau khi kiểm tra dương vật, đặt sonde niệu đạo hoặc là soi bàng quang. Ngoài ra còn có nguyên nhân do tổn thương thân ngóni hoặc tuy nhiên nguyên nhân này ít gặp.

Paraphimosis

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 11 2013 08:15 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 20:27

III. Sinh lý bệnh:

Khi da quy đầu bị kẹt lại phía sau rãnh quy đầu sẽ gây nên 1 nút thắt làm tắc nghẽn lưu thông mạch máu và bạch huyết. Hậu quả là làm quy đầu bị sưng phù nề thiểu máu nuôi dưỡng.

Thiểu máu và phù nề sẽ làm đau quy đầu. Nếu không điều trị tình trạng này kéo dài sẽ làm hoại tử quy đầu.

IV. Lâm sàng:

1. Triệu chứng cơ năng:

- Đau
- Sưng quy đầu
- Tiểu khó
- Bí tiểu

2. Triệu chứng thể thức:

- Swell
- Quy đầu sưng to da quy đầu tấy đỏ 1 vòng thắt tại rãnh quy đầu
- Nếu tại rãnh quy đầu có thể hoại tử

3. Các giai đoạn:

- Giai đoạn sớm:

Paraphimosis

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 11 2013 08:15 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 20:27



- Giai đoạn giữa:



- Giai đoạn trễ:

Paraphimosis

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 11 2013 08:15 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 20:27



Đầu tiên, cần phải giải phóng đầu dương khỏi rãnh quy đầu. Phương pháp:



Bằng ngón tay cái và ngón trỏ, người ta ấn vào phần da bị sưng, đẩy nó về phía trước, qua rãnh quy đầu, để giải phóng đầu dương. Nếu không được, cần phải cắt da bị sưng bằng dao mổ.