

Ths Bs Lê TĐ Đỉnh - ICU

Các dữ liệu sơ bộ từ nghiên cứu U-BIOPRED gợi ý các bệnh nhân hen phế quản nặng ít có khả năng đáp ứng với điều trị bằng steroid hơn so với các bệnh nhân hen phế quản mức độ nhẹ hoặc trung bình.

Phân tích đầu tiên của dữ liệu từ một nhóm 470 bệnh nhân mức hen phế quản tuột từ trung thành gồm 372 trường hợp hen phế quản nặng và 98 trường hợp hen phế quản nhẹ đến trung bình và 100 người không thể nhận cho thấy 44,4 % bệnh nhân bệnh hen phế quản nặng vẫn còn xuất hiện các đợt cấp và các triệu chứng nghiêm trọng mặc dù đã dùng liều cao corticosteroid.

"Một tìm kiếm đáng kể bệnh nhân bệnh hen phế quản nặng cần phải duy trì liều pháp corticosteroid uống qua đường uống, tuy nhiên nhóm này có thể không nhạy cảm với tác dụng chống viêm của corticosteroid", Bác sĩ David Gibeon, nhà nghiên cứu lâm sàng tại Airway Division, Imperial College và làm việc tại Bệnh viện Brompton Hoàng gia ở London, Vương Quốc Anh nói, "Có một nhu cầu chưa được đáp ứng rõ ràng cho nhóm bệnh nhân này".

Hen phế quản nặng có thể đáp ứng kém với Steroids

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 26 Tháng 2 2014 13:04 - Lần cập nhật cuối: Thứ 7, 26 Tháng 2 2014 13:13



~~Đây là tài liệu tham khảo, không phải là tài liệu chính thức. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tài liệu gốc.~~