

Ds Nguyễn Thị Mai

Cơ quan quản lý Thuốc phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận sử dụng thuốc Contrave để quản lý triệu chứng lâm sàng của thuốc, thuốc này được thêm vào trong chế độ ăn giảm calo và hoạt động thể chất.

Contrave là một sự kết hợp của hai loại thuốc được FDA phê chuẩn trong một công thức giải phóng kéo dài gồm:

- Naltrexone (Revia, Vivitrol) được sử dụng để điều trị nghiện rượu và nghiện chất dùng thuốc phiện

- Bupropion (Wellbutrin, Zyban) được sử dụng để điều trị trầm cảm và rối loạn tình cảm theo mùa, và là một trợ giúp để điều trị cai nghiện thuốc lá.

Contrave được chấp thuận sử dụng ở người lớn có chỉ số khối cơ thể (BMI) là 30 hoặc cao hơn (béo phì) hoặc người lớn có chỉ số BMI là 27 hoặc cao hơn (thừa cân), những người có ít nhất một điều kiện liên quan đến triệu chứng như cao huyết áp, bệnh tiểu đường typ 2, cholesterol cao.

trường tần số số điện thoại của phi

	Sáng Liều	Liều tối
Khởi điểm: Tuần 1	1 viên	Không
Tuần 2	1 viên	1 viên
Tuần 3	2 viên	1 viên
Tuần 4	2 viên	2 viên