

Các lo^oi thu^oc làm tăng men gan

Vi^ot b^oi Biên t^op viên

Th^o t^o, 15 Tháng 10 2014 17:47 - L^on c^op nh^ot cu^oi Th^o t^o, 15 Tháng 10 2014 17:52

Ds Nguy^on Th^o Th^oúy H^ong

Men gan là m^ot lo^oi enzym n^om trong t^o bào gan, do gan s^on xu^ot ra hay còn g^oi là alanine aminotransferases (ALT). M^oi khi m^ot t^o bào gan b^o ch^ot đi do lão hóa thì có m^ot l^oo^ong men gan đ^oc phóng vào máu ^o n^ong đ^o đ^oi 40U/l. N^ou ch^o s^o này cao h^on nghĩa là gan c^oa b^on đang b^o h^o h^oi.

Thông th^oo^ong có b^on lo^oi men gan bao g^om: AST (Aspart transaminase) hay còn g^oi là SGOT; ALT (Alanin transaminase) hay còn g^oi là SGPT (Serum glutamic pyruvic transaminase); phosphatase ki^om; GGT (Gama glutamyl transpeptidase). Trong b^on lo^oi men gan thì AST (SGOT) và ALT (SGPT) đóng vai trò ch^o y^ou ph^on ánh tình tr^ong c^oa t^o bào gan.

Men gan bình th^oo^ong là men gan khi các ch^o s^o xét nghi^om đ^ot:

- AST: 20 – 40 UI/L
- ALT: 20 – 40 UI/L
- GGT: 20 – 40UI/L
- Phosphatase ki^om: 30 – 110 UI/L.

Có nhi^ou nguyên nhân khác nhau đ^on đ^on vi^oc men gan tăng cao nh^o viêm gan, do r^ou bia.. trong đó ph^oi k^o đ^on nguyên nhân dùng m^ot s^o lo^oi thu^oc không t^ot cho gan hay có khi còn gây đ^oc cho gan. H^ou nh^o m^oi lo^oi thu^oc dùng đ^ou có ^onh h^oo^ong gan và gây ra các t^on th^oo^ong khác nhau:

-T^on th^oo^ong gan c^op

Các loại thuốc làm tăng men gan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 15 Tháng 10 2014 17:47 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 15 Tháng 10 2014 17:52

Thuốc	Các tổn thương
Acetaminophen, Allopurinol, Aspirin, Diclophenac, Isoniazid, Ketoconazol, Lisinopril, Rifamycin..	Hủy hoại tế bào gan
Amoxicillin/Clavulanate, Clopidogrel, Irbesartan,...	Ứ mật
Captopril, Carbamazepine, Clindamycin, Enalapril, Phenobarbital	Hỗn hợp

Tổn thương gan mãn:

Thuốc	Các tổn thương
Aminodarone, Tamoxifen, Valproic acid	Viêm gan nhiễm mỡ
Allopurinol, Carbamazepine, Sulfonamides	Viêm gan u hạt
Methotrexate, Methyl dopa	Xơ hóa
Diclophenac, Methyl dopa,...	Viêm gan mạn
Thuốc ngừa thai uống, Vinyl chlorid	U gan
Ergot	Thiếu máu hoại tử gan

Phản ứng dị ứng với thuốc gây tổn thương gan có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em, người già và phụ nữ. Nguyên nhân của phản ứng dị ứng với thuốc gây tổn thương gan có thể do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: di truyền, môi trường, chế độ ăn uống, lối sống, tình trạng sức khỏe, v.v.