

Ds Nguy ậ n Th ậ Thúy H ậ ng

Allopurinol ậ c ch ậ enzym Xanthinoydase, là enzym có vai trò chuy ậ n các ti ậ n ch ậ t hypoxanthin thành acid uric nh ậ đó nó làm gi ậ m n ậ ng đ ậ acid uric trong máu. Acid uric huy ậ t tăng cũng có th ậ gây b ậ nh th ậ n và s ậ i th ậ n. Do v ậ y Allopurinol đ ậ c dùng đ ậ ngăn ng ậ a s ậ i th ậ n do acid uric và ngăn ng ậ a c ậ n viêm kh ậ p gut c ậ p.

H ậ n nay, Allopurinol đ ậ c s ậ d ậ ng r ậ ng r ậ i trên th ậ tr ậ ng đ ậ đi ậ u tr ậ b ậ nh kh ậ p do gút, s ậ n urat ậ da và s ậ i th ậ n. Các tác d ậ ng ph ậ khi s ậ d ậ ng thuộ c đã đ ậ c bi ậ t đ ậ n nh ậ : phát ban da, th ậ ng là ban s ậ n ho ậ c ng ậ a, đôi khi là ban xu ậ t huy ậ t, nh ậ ng có th ậ x ậ y ra ph ậ n ậ ng quá m ậ n nguy hi ậ m h ậ n bao g ậ m phát ban tróc v ậ y, h ậ i ch ậ ng Stevens-Johnson và ho ậ i t ậ bi ậ u bì đ ậ c tính.

