

Các lo^oi thu^oc làm tăng men gan

Vi^ot b^oi Biên t^op viên

Th^o t^o, 15 Tháng 10 2014 17:47 - L^on c^op nh^ot cu^oi Th^o t^o, 15 Tháng 10 2014 17:52

Ds Nguy^on Th^o Th^oúy H^ong

Men gan là m^ot lo^oi enzym n^om trong t^o bào gan, do gan s^on xu^ot ra hay còn g^oi là alanine aminotransferases (ALT). M^oi khi m^ot t^o bào gan b^o ch^ot đi do lão hóa thì có m^ot l^oo^ong men gan đ^oc phóng vào máu ^o n^ong đ^o đ^oi 40U/l. N^ou ch^o s^o này cao h^on nghĩa là gan c^oa b^on đang b^o h^o h^oi.

Thông th^oo^ong có b^on lo^oi men gan bao g^om: AST (Aspart transaminase) hay còn g^oi là SGOT; ALT (Alanin transaminase) hay còn g^oi là SGPT (Serum glutamic pyruvic transaminase); phosphatase ki^om; GGT (Gama glutamyl transpeptidase). Trong b^on lo^oi men gan thì AST (SGOT) và ALT (SGPT) đóng vai trò ch^o y^ou ph^on ánh tình tr^ong c^oa t^o bào gan.

Men gan bình th^oo^ong là men gan khi các ch^o s^o xét nghi^om đ^ot:

- AST: 20 – 40 UI/L
- ALT: 20 – 40 UI/L
- GGT: 20 – 40UI/L
- Phosphatase ki^om: 30 – 110 UI/L.

Có nhi^ou nguyên nhân khác nhau đ^on đ^on vi^oc men gan tăng cao nh^o viêm gan, do r^ou bia.. trong đó ph^oi k^o đ^on nguyên nhân dùng m^ot s^o lo^oi thu^oc không t^ot cho gan hay có khi còn gây đ^oc cho gan. H^ou nh^o m^oi lo^oi thu^oc dùng đ^ou có ^onh h^oo^ong gan và gây ra các t^on th^oo^ong khác nhau:

-T^on th^oo^ong gan c^op

Các loại thuốc làm tăng men gan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 15 Tháng 10 2014 17:47 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 15 Tháng 10 2014 17:52

Thuốc	Các tổn thương
Acetaminophen, Allopurinol, Aspirin, Diclophenac, Isoniazid, Ketoconazol, Lisinopril, Rifamycin..	Hủy hoại tế bào gan
Amoxicillin/Clavulanate, Clopidogrel, Irbesartan,...	Ứ mật
Captopril, Carbamazepine, Clindamycin, Enalapril, Phenobarbital	Hỗn hợp

Tổn thương gan mãn:

Thuốc	Các tổn thương
Aminodarone, Tamoxifen, Valproic acid	Viêm gan nhiễm mỡ
Allopurinol, Carbamazepine, Sulfonamides	Viêm gan u hạt
Methotrexate, Methyl dopa	Xơ hóa
Diclophenac, Methyl dopa,...	Viêm gan mạn
Thuốc ngừa thai uống, Vinyl chlorid	U gan
Ergot	Thiếu máu hoại tử gan

Phản ứng dị ứng gan do thuốc gây ra có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em, người già và phụ nữ. Nguyên nhân gây ra phản ứng dị ứng gan do thuốc là do sự tích tụ của thuốc trong gan, dẫn đến tổn thương gan. Các triệu chứng của phản ứng dị ứng gan do thuốc bao gồm: vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng, sốt, sưng khớp, ngứa da, v.v.