

Ds Trộn Thuốc Kiềm Dị M

Codein là một thuốc chống đau có tác dụng khá rõ rệt do có tính chất giảm đau, gây ngủ và giảm ho nên thường được kết hợp với các thuốc giảm như Paracetamol để tăng hiệu quả giảm đau, kết hợp với thuốc long đờm để trị chứng ho khan. Tuy nhiên sử dụng Codein kéo dài sẽ gây nên tình trạng nghiện thuốc. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thuốc ho có chứa hoạt chất Codein, có rất nhiều loại biệt dược như Terpin Codein, Calyptin Codein...



Số việc xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh khi nhiều em học sinh lạm dụng thuốc ho có hình chữ U với tên gọi Terpin Uphace không theo hướng dẫn của thầy thuốc, sử dụng sai mục đích đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, nhiều học sinh đã trở thành nghiện Codein và ph

thuốc vào thuốc.



Codein là thuốc gây nghiện:

Codein có bản chất hóa học là Methylmorphin, là alkaloid của [thuốc phiện](#), nên có tác động giảm đau và [giảm ho](#)

giống như Morphin, tuy nhiên tác động giảm đau và giảm ho của Codein kém Morphin 10 lần. Giống với Morphin, Codein cũng gây ức chế hô hấp, ức chế co thắt cơ trơn đường tiêu hóa. Codein hấp thu tốt ở đường uống, trong cơ thể có khoảng 10% Codein được chuyển hóa thành Morphin. Vì tính chất gây nghiện của Codein nên không sử dụng Codein quá 10 ngày.

Sử dụng Codein theo chỉ định giảm đau và giảm ho:

Vì có công thức hóa học giống với Morphine và khi chuyển hóa trong cơ thể 10% Codein chuyển hóa thành Morphine nên khi sử dụng với liều cao có thể gây các triệu chứng tê liệt, mất ngủ, ma túy nhẹ gây say ngạo, lâng lâng, ảo giác, hưng phấn, kích thích thần kinh, mất phối hợp vận động... Sử dụng Codein có thể có các triệu chứng không mong muốn như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, táo bón, khô miệng, đái ít, mất ngủ, hồi hộp, mất ngủ, huyếch trương, vã mồ hôi, đổ mồ hôi...

Chỉ định và chống chỉ định sử dụng Codein:

Codein được chỉ định để điều trị các chứng ho khan hay ho do phản xạ. Codein cũng được chỉ định để giảm đau trong những trường hợp đau nhẹ và vừa. Chống chỉ định sử dụng Codein: Những người mắc bệnh, dùng với Codein, trẻ em dưới 1 tuổi, suy gan, suy hô hấp, phụ nữ mang thai. Thận trọng khi sử dụng Codein ở người suy thận, người có bệnh lý hô hấp như hen phế quản, khí phế thũng, người đang cho con bú thì tốt nhất nên sử dụng Codein. Các khuyến cáo của thuốc khi dùng là nên khuyến cáo người sử dụng đọc kỹ và đọc các loại thuốc nói chung và các chế phẩm có chứa Codein nói riêng.

Triệu chứng nghiện Codein:

Liều dùng thuốc có thể dẫn tới tình trạng nghiện Codein, trạng thái say ngạo mà Codein mang lại cho người dùng có thể dẫn đến lệ thuộc cả về mặt tâm lý và thể chất. Dùng Codein trong thời gian dài với liều từ 240 - 540 mg/ngày có thể gây nghiện thuốc. Các biểu hiện thường gặp khi thiếu thuốc là bồn chồn, run, co giật cơ, toát mồ hôi, chảy nước mũi... Codein khiến người dùng thuốc lệ thuộc về tâm lý, và thể chất, dùng thì có tình trạng 'quen thuốc' tức là có sự dung nạp thuốc dẫn tới liều dùng thông thường không mang lại sự hưng phấn, vì vậy người sử dụng thuốc luôn có xu hướng tăng liều dùng để đạt được cảm giác say ngạo và thoải mái mà thuốc mang lại. Những người dùng thuốc Codein kéo dài khi bỏ nghiện thì thường có xu hướng dùng Codein để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống cá nhân như căng thẳng, stress, phiền muộn... Một số người nghiện Codein thường thích dùng với những chất khác như rượu, thuốc an thần để tăng cảm giác say ngạo. Những vấn đề trên có thể dẫn đến những hiểm họa khôn lường, người sử dụng có thể bị suy hô hấp do sử dụng thuốc quá liều, dẫn đến hôn mê và tử vong nếu không được phát hiện, cấp cứu và điều trị kịp thời.

Rối loạn tâm thần do Codein:

Cơ sở pháp lý thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 07:30 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 18:23

Giống như nghiện ma túy, nghiện ngấm i nghiện Codein thường có trạng thái rời loãn tâm thần, mất sự trạng thái rời loãn có thể xảy ra như: rời loãn lo âu, rời loãn lờnng cởc, trầm cởm, rời loãn nhân cách và tâm thần phân liệt, ngấm i bởnh có thể có nhởng suy nghĩ và hành vi có thể làm hại đến bởn thân mình hoặc nhởng ngấm i xung quanh. Ngấm i nghiện thuốc khi ngấm ng sỏ dĩng dĩt ngấm gây nên trạng thái đối thuốc sỏ có cởm giác thèm thuốc, đau bởng, vã mỏ hôi, buỏn nôn, nôn, co thắt cổ, trong cởn thêm thuốc có thể xuất hiỏn ỏo giác, có ý nghĩ tở tở hoặc ý nghĩ sát hại ngấm i khác...

Vì vậy, ngày 07/7/2016, Cởc Quản lý Dược Việt Nam có công văn 12973/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ỏng; Các bởnh viện, viện có giỏng bởnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sỏn xuất thuốc lỏu hành tại Việt Nam về việc cởp nhỏt thông tin dỏc lý của thuốc chứa Codein. Nhỏm dĩm bỏo mỏc tiêu sỏ dĩng thuốc hợp lý, an toàn và hiỏu quả, Cởc Quản lý Dược yêu cỏu:

1. Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ỏng và các Bởnh viện, Viện có giỏng bởnh trực thuộc Bộ Y tế:

Tiếp tục thông báo cho các cở sở khám chữa bởnh, các dĩn về kinh doanh dỏc phẩm trên dĩa bàn các thông tin liên quan đến khuyỏn cáo của EMA đã nêu tại công văn sỏ [18905/QLD-TT](#) ngày 06/10/2015 của Cởc Quản lý Dược; dĩng thỏi tăng cỏng thỏc hiỏn việc theo dõi tác dĩng không mong muỏn của thuốc trong quá trình sỏ dĩng và lỏu hành; gửi báo cáo ADR (nếu có) về Trung tâm Quỏc gia về thông tin thuốc và theo dõi phỏn ỏng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội) hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phỏn ỏng có hại của thuốc TP. Hồ Chí Minh (201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

2. Đối với các công ty đăng ký, sỏn xuất:

a. Đối với các thuốc chứa hoạt chất codein đã dĩm cởp phép lỏu hành trên thỏ trỏng:

- Trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký công văn này, yêu cỏu công ty đăng ký, nhà sỏn xuất thỏc hiỏn việc cởp nhỏt, bổ sung vào nhãn, tờ hỏỏng dĩn sỏ dĩng thuốc và/hoặc tờ thông tin cho bởnh nhân nỏi dung các mỏc Chỏ dĩnh, Liỏu lỏỏng và cách dùng, Chỏng chỏ dĩnh, Thỏn trỏng và cỏnh báo dĩc biỏt khi sỏ dĩng, Sỏ dĩng thuốc cho phỏn nỏ có thai và phỏn nỏ cho con bú, Dĩm c

Cấp nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Codein

Vị trí biên tập viên

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 07:30 - Lần cấp nhật cuối Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 18:23

tính được các hướng theo Phụ lục đính kèm công văn này.

- Hình thức cấp nhật: Công ty tiếp cấp nhật theo hướng dẫn tại khoản 4 điều 9 Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định về việc đăng ký thuốc.

b. Đối với các hướng số đăng ký thuốc chứa hoạt chất codein đang chờ xét duyệt tại Cục Quản lý Dược:

- Cục Quản lý Dược chỉ xem xét cấp số đăng ký sau khi công ty nộp tài liệu cấp nhật, bổ sung nội dung các mục Chế độ nh, Liều dùng và cách dùng, Chế độ nh chế độ nh, Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng, Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú, Đặc tính dược lý các hướng nh đã nêu trong công văn này vào các phần có liên quan của hướng số và đặc tính nh chế độ nh để yêu cầu.