


DS. Võ Thị Thu

Tên chung quốc tế : Suxamethonium

Loại thuốc: Thuốc chẹn thần kinh – cơ khơ c c

Dạng thuốc và hàm lượng: ống tiêm Suxamethonium clorid : 20 mg; 50mg; 100mg/ml. L thuốc tiêm: 50mg; 100mg.



Dược lý và cơ chế tác động: Suxamethonium là thuốc chẹn thần kinh – cơ khơ c c. Các thuốc chẹn thần kinh – cơ khơ c c c nh tranh với Acetylcholin ở thụ thể cholinergic tại bề mặt v n d ng và cũng gi ng nh Acetylcholin, chúng g n vào các thụ thể đó gây nên khơ c c. Tuy nhiên, do ái lực cao với thụ thể cholinergic và tính kháng acetylcholinesterase, thuốc gây khơ c c kéo dài hơn acetylcholin. Tác động này lúc đầu gây ra cơ co thảo qua, thụ ng thụ y nh gi t bó c , sau đó c ch d n truy n thụ n kinh – c . Khi u ch n thụ n kinh – c này không b đ i kháng, thụ m chí có thể đ c tăng c ng b i các thuốc kháng cholinesterase. Dùng kéo dài hoặc nh c i các thuốc ch n thụ n kinh – c khơ c c có thể gây ra ch n thụ n kinh – c gi ng nh ch n thụ n kinh – c không khơ c c d n đ n suy hô h p kéo dài hoặc ng ng thụ .

Suxamethonium đ c dùng ch y u đ gây giãn c trong các thụ thụ t ng n nh đ t n i khí qu n, n i soi, ti u ph u, li u pháp gây s c b ng đ i n hoặc b ng thuốc sau khi đã gây mê toàn thân. Suxamethonium đ c dùng ch y u đ gây giãn c trong thụ thụ t ch nh hình. Do thụ i gian tác đ ng ng n, Suxamethonium thụ ng là thuốc ch n thụ n kinh - c khơ c c đ c ch n cho thụ thụ t kéo dài đ i 3 phút. Ngoài ra do thuốc b t đ u tác đ ng nhanh, nên thuốc thích

Cơ sở pháp lý thông tin mới về các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium

Vị trí biên tập viên

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 09:04 -

hợp cho tình trạng cơ thể khi cần đặt nội khí quản nhanh. Thời gian tác động của Suxamethonium có thể kéo dài bằng cách truyền tĩnh mạch liên tục hoặc chia thành liều nhỏ để tiêm.

Chỉ định: Hỗ trợ gây mê toàn thân, tạo thuận lợi cho đặt nội khí quản, giãn cơ trong phẫu thuật hoặc thông khí cơ học (thở máy), giúp mất cơ trong nạn nhân gãy.

Nhưng theo nguồn tin mới cơ sở pháp lý vào 25/12/2017 thì chế định của các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium được ghi nhận lại, cụ thể như sau:

- Cần nhắc việc sử dụng Suxamethonium trong chế định giãn cơ cho các phẫu thuật ngắn không còn thích hợp với các tiêu chuẩn hiện hành, mặt khác, do nguy cơ gây phản vệ khi sử dụng các cura giãn cơ nói chung và đặc biệt là Suxamethonium, các chế phẩm có chứa Suxamethonium không được sử dụng với chế định "gây mê tác động ngắn trong phẫu thuật".

- Các chế định của Suxamethonium từ nay được ghi nhận như một thuốc trợ mê cho gây mê toàn thân:

+ Người lớn và trẻ em: hỗ trợ đặt nội khí quản để nhanh chóng tiến hành thủ thuật được chỉ định bằng cách hít phôi để chèn đầy

+ Người lớn: trong điều trị bằng liều pháp số để có được sự giãn cơ nhanh chóng.

Thông tin dành cho các bác sĩ chuyên khoa cơ thể, gây mê hồi sức và đặc biệt là bệnh viện.

Người n: Chỉ nh giác được, Được c th qu c gia Việt Nam

Bên quy định thu c Trung tâm Qu c gia và Thông tin thu c và Theo dõi ph n ng có h i c a

Cập nhật thông tin mới về các chế phẩm tiêm chủng Suxamethonium

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 09:04 -

thư c

Địa chỉ : 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội