

Các nội dung thay đổi, bổ sung đổi với thuốc chẹn a phospholipid đư u nành

Vi t b i Biên t p viên

Th b y, 26 Tháng 1 2019 11:15 - L n c p nh t cu i Th b y, 26 Tháng 1 2019 11:18

Ds Ph m Phú Trí - Khoa D c

Công văn s 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 c a C c Qu n lý D c g i S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ng; Các b nh vi n, vi n có gi ng b nh tr c thu c B Y t ; Các công ty đ ăng ký, s n xu t thu c l u hành t i Vi t Nam v vi c c p nh t thông tin h ng đ n s d ng đ i v i thu c ch a phospholipid đ u nành.



Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả

Đ th ng nh t v ch đ nh, ch ng ch đ nh, li u dùng và cách dùng thu c ch a phospholipid đ u nành, căn c k t lu n c a H i đ ng T v n c p gi y đ ăng ký l u hành thu c, nguyên li u làm thu c - B Y t ; nh m đ m b o m c tiêu s đ ng thu c h p lý, an toàn và hi u qu .

Các n i dung thay đ i/ b sung đ i v i thu c ch a phospholipid đ u nành (Đính kèm theo công văn 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 c a C c Qu n lý D c) c th nh sau:

[Đ i v i t t c các thu c ch a phospholipid đ u nành, thông tin trên nhãn thu c và t h ng đ n s d ng yêu c u thay đ i n i dung các m c Ch đ nh, Ch ng ch đ nh, Li u dùng và cách dùng theo đúng các thông tin đ c cung c p đ i đây]

Các nội dung thay đổi, bổ sung đối với thuốc chứa phospholipid được nêu như sau

Vị trí bổ sung biên tập viên

Thứ bảy, 26 Tháng 1 2019 11:15 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 26 Tháng 1 2019 11:18

1. Chỉ định:

Cải thiện các triệu chứng bệnh lý gan như chán ăn, đau hạ sườn phải, tổn thương gan do nhiễm độc và viêm gan.

2. Chỉ định chỉ định:

Quá mẫn với protein được nêu như sau, được liệt kê thành phần nào của thuốc.

3. Liều dùng và cách dùng:

- Ngẫu nhiên: 1800 mg/ngày chia 2 - 3 lần.
- Nên uống thuốc cùng bữa ăn.
- Không nên sử dụng thuốc này cho trẻ em dưới 18 tuổi do chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Nguồn: <http://www.dav.gov.vn/>