

Lưu ý khi sử dụng thuốc diazepam

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 10:54 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 11:03

Ds Lê Thị Cẩm Nhung -

Diazepam là thuốc hạ thần kinh nhóm benzodiazepine tác dụng kéo dài. Diazepam có tác dụng an thần làm giảm căng thẳng, kích thích, lo âu và gây ngủ. Ngoài ra, Diazepam còn làm giãn cơ, chống co giật. Thuốc được dùng trong thời gian ngắn để điều trị trạng thái lo âu căng thẳng dùng làm thuốc an thần, tiền mê, chống co giật (đặc biệt trạng thái động kinh và co giật do sốt cao), chống co cứng cơ và làm giảm hội chứng cai rượu.

1. Các dạng thuốc và hàm lượng:

- Thuốc uống: dung dịch thuốc, dung dịch siro thuốc hoặc dung dịch thuốc trong sorbitol 2mg/5ml, dung dịch uống 5mg/5ml, dung dịch uống đậm đặc 5mg/1ml

- Viên nén: 2mg, 5mg, 10mg.

- Thuốc tiêm: ống tiêm 10mg/2ml, ống 50mg/10ml.

- Thuốc trà: Viên nén 5mg, 10mg, dung dịch trà thuốc 5mg, 10mg

2. Chống chỉ định:

- Trạng thái lo âu, kích thích, mất ngủ.

- Trong trường hợp hợp trầm cảm có triệu chứng nặng nề trên, có thể chống chỉ định dùng diazepam cùng với các thuốc chống trầm cảm.

Lưu ý khi sử dụng thuốc diazepam

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 10:54 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 11:03

- Sử dụng rượu u c p, các b nh ti n s ng và các tri u ch ng c p cai r u.

- Có co c ng do não ho c th n kinh ngo i biên, co gi t.



[Xem tiếp tại đây](#)