

Một số thông tin tác dụng của n lưu ý khi sử dụng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:09 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:16

Ds Đông y Thảo Dược Hà -

STT	Họ tên chất	Tung tác	Mức độ	Cơ chế	Hậu quả	Giải pháp
1	Amikacin	Furosemid	Nguy hiểm	Tăng nồng độ Amikacin trong máu và mô	Tăng độc tính trên thận và thính giác (nghe tiếng ù)	Nên tránh phối hợp, nếu bắt buộc phải phối hợp nên giảm liều Amikacin và tăng liều furosemid theo dõi định kỳ
2	Amiodaron	Digoxin	Nguy hiểm	Liên tương tác ở Digoxin trong máu	Giảm ngộ độc	Nên giảm 1/2 liều 1/3 liều digoxin khi bắt đầu dùng amiodaron và tiếp tục giảm chính liều sau 1 hoặc 2 tuần có thể sau 1 tháng sử dụng ngừng dùng amiodaron. Tiếp tục theo dõi các dấu hiệu ngộ độc như nôn, buồn nôn, rối loạn nhịp tim
3	Amiodaron	Morfocaciac	Nguy hiểm	Tăng tác dụng ức chế dẫn truyền QT	nguy cơ độc tính trên tim mạch	Chống chỉ định phối hợp
4	Aspirin	Heparin (tổng)	Nguy hiểm	Tăng nguy cơ chảy máu		Nên tránh phối hợp 2 thuốc, nếu cần phải phối hợp 2 thuốc, chỉ theo dõi chặt chẽ các chỉ số về nghiêm trọng máu chảy bầm và biến hiện xuất huyết trên bình thường
5	Aspirin	Ketorolac	Nguy hiểm	Liên tương tác dạng phụ của Ketorolac	Tăng nguy cơ loét dạ dày và xuất huyết	Chống chỉ định phối hợp

[Xem tiếp đây](#)