


Bs Huỳnh Minh Nhật -

GIỚI THIỆU

Nuốt phải dị vật là tình trạng thường gặp trong thực hành lâm sàng. Phần lớn trường hợp nuốt dị vật xảy ra ở trẻ em. Việc nuốt phải dị vật thường là vô ý, dù cố ý hay vô ý, hay gặp ở người cao tuổi, người có rối loạn tâm thần chậm phát triển trí tuệ, người đờ đẫn và nghiện rượu.

Hầu hết dị vật (80 - 90%) đi ra ngoài một cách tự nhiên. Tuy nhiên, khoảng 10 - 20% trường hợp cần can thiệp nội soi loại bỏ và ít hơn 1% số cần phẫu thuật để lấy dị vật hoặc điều trị các biến chứng.



CHẨN ĐOÁN

Trẻ em và người lớn có thể xác định được nuốt phải dị vật và chỉ ra vùng khó chịu. Tuy nhiên, chẩn đoán tích cực vùng khó chịu thường không thông quan với vị trí bị chèn ép. Thông thường, các triệu chứng xảy ra ngay sau khi nuốt phải dị vật. Trẻ nhỏ hay người bị rối loạn tâm thần có thể biểu hiện bằng ngớ ngẩn, bỏ ăn, nôn mửa, chảy nước dãi, thở khò khè, nước bọt dính máu hoặc suy hô hấp. Thông thường, người bệnh có dấu hiệu quấy rối có thể gây sưng nề, đỏ, căng đau vùng cổ. Các bác sĩ lâm sàng cần phát hiện những tình trạng cần phải phẫu thuật như viêm phúc mạc hoặc tắc ruột non.

[Xem tiếp tại đây](#)

Lý do viết đề nghị tiêu hoá trên qua nội soi

Viết bởi: Biên tập viên

Chỉnh sửa, 03 Tháng 3 2024 17:42 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 05 Tháng 3 2024 17:59
