

Bs Nguyễn Minh Đức - Khoa RHM

I. ĐẶT CÂU NG


- Gãy phức hợp gò má đã được báo cáo lần đầu vào năm 1650 trước Công nguyên, được tìm thấy trong các văn bản của Edwin Smith. Sau đó Duverney (1751) đã quan sát và mô tả nhĩ u tròng hợp gãy phức hợp gò má. Lothrop (1906), Keen (1909), Gilies (1927), Dingman and Natvig (1964), Adams (1942), Kishchener (1951) ... đã đưa ra các phương pháp và các đường rạch phẫu thuật để điều trị gãy phức hợp gò má.

- Gãy phức hợp gò má thường gặp trong chấn thương mặt, đáng chú ý sau gây xẹp mũi.

- Dịch tễ tùy vào xã hội, nền kinh tế, giáo dục của cộng đồng.

+ Tại Mỹ, nguyên nhân thường chiếm 80% (theo Ellis và cộng sự), Jonathan S. Bailey, Michael S. Goldwasser (2004) thì thấy do tai nạn xe 2 bánh có gần 50% là nhĩ u nhĩ t.

+ Tại Việt Nam, nguyên nhân thường gặp nhất là tai nạn giao thông. Gãy phức hợp gò má 2 bên ít gặp và thường bên trái nhĩ u hơn bên phải.



Phác đồ điều trị gãy phêm hợp gò má

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 17:38 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 17:43

[Xem toàn văn tại đây](#)