

Bs CKI Phạm Văn Sáu - Khoa Cấp Cứu

Vào ngày 23/08/2014 – BVĐK Quãng Nam đã cấp cứu kịp thời cho 02 cha con bệnh nhân: Đoàn Văn T. (cha) và Đoàn Thị Th. (con gái). Do ăn thối vài hạt Bọ đậu thối béo và ngon, khoanh hén 01 giờ sau, cả hai cha con cùng xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy phân toàn nước nhầy lờn, ngầy i lờ mờ mất nhiệt, được gia đình đưa vào khoa cấp cứu BVĐK Quãng Nam cùng với mẫu cây Bọ đậu và hạt. Hai bệnh nhân đã được ngộ độc cấp do ăn hạt Bọ đậu, được các Bác sĩ kịp thời cấp cứu truy n dịch, làm các xét nghiệm theo dõi chức năng gan, thận và được chuyển Khoa Hồi Sức Tích Cực Chăm sóc theo dõi điều trị.

Đây là trường hợp ngộ độc hạt Bọ đậu đầu tiên tại BVĐK Quãng Nam. Loại cây và hạt bọ đậu mà 02 cha con ăn phải – qua tìm hiểu tài liệu của DS. Phan Đức Bình thì đây là cây Bọ đậu nam, còn gọi là cây Đậu lai, cây Đậu mè, Đậu củ cào, Purging nut tree (Anh), Pourghère (Pháp), tên khoa học *Jatropha curcas* L. (Euphorbiaceae).

Bọ đậu nam (Đậu lai) là cây bụi, cao 1 - 5 m, có nhũ dính trong, nhầy. Phiến không lông, đáy hình tim, có thùy; cuống dài 5 - 12 cm. Tạng phôi nang phân, dính chu; lá dài 5; cánh hoa 5, trắng; nhụy 5 dính nhau, 5 rìi. Trái nang to 2,5 cm, vàng lúc chín, chứa 3 hạt cao 18 mm, đen, mỏng trắng. Gốc Brasil, mọc hoang hoặc trồng khắp nước ta để lấy hạt ép dầu. Hạt có dulcitol. Đậu tố hạt độc (chứa curcin là một toxalbumin), có khi dùng để xỏ mũi nh (độc), chườm ngoài da trị ghẻ và loét ngoài da. Nhũ dính (mủ) dùng thuốc cá. Vỏ cây chứa b-amirin, taraxerol, b-sitosterol; lá, chứa ch a? -amirin, campesterol. Lá già độc, có tính chống ung thư bạch huyết (leukemia), nhúng đất có khi luộc ăn và có nòi dùng nhè trà hay đắp vú lờ sữa. Mủ cầm máu vết, trị nhọt, lở mồm.

Ngũ đại cẩu vì ăn hạt của cây bồ đề

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 31 Tháng 8 2014 17:04 - Lần chỉnh sửa cuối: 31 Tháng 8 2014 17:14



Ngũ đại cẩu là một loài thực vật có hoa, thuộc họ Cà. Loài này có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện nay được trồng rộng rãi ở nhiều nơi. Ngũ đại cẩu có quả tròn, màu xanh, khi chín chuyển sang màu đỏ. Quả của loài này có vị chua ngọt, thường được dùng để làm mứt hoặc ăn tươi. Ngũ đại cẩu cũng có thể được dùng để làm thuốc.

Ngũ dĩ cạp vì ăn hột của cây bồ đề u

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 31 Tháng 8 2014 17:04 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 31 Tháng 8 2014 17:14



Đang chờ nội dung ảnh. Hình ảnh này đang chờ được tải lên. Vui lòng thử lại sau.