

Chăm sóc bệnh nhân gãy liên mấu chuyên xương đùi

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:29 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:41

ĐD Phạm Thị Huỳnh Công - Ngoại CT

A. ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG PHỤ THUẬT:

Bệnh nhân gãy liên mấu chuyên xương đùi loại không di lệch hoặc di lệch vừa thường được điều trị bảo tồn:

- Bệnh nhân trẻ có thể được bó bột chèn đùi bàn chân và cho tập sớm.
- Bệnh nhân lớn tuổi, đa số được bó bột chèn xoay
- Gãy liên mấu chuyên điều trị bảo tồn thường lành xương sau 3 -5 tháng nhưng bệnh nhân chèn có thể xảy ra bệnh nhân lớn tuổi do nằm lâu.

Chăm sóc bệnh nhân gãy liên mấu chuyên xương đùi

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:29 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:41



Chẩn đoán lâm sàng: gãy xương đùi bên phải. Chẩn đoán hình ảnh: X-quang khớp gối và xương đùi bên phải cho thấy gãy xương đùi bên phải, đoạn trên, gãy chéo, mất tiếp xúc. Bệnh nhân có dấu hiệu đau, sưng, biến dạng và mất chức năng vận động ở khớp gối bên phải. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.