

Huấn luyện Thạc Sĩ Lanh ĐDCĐ, Khoa Y học nhi khoa

Tiêu chảy là hiện tượng đi tiêu ra phân có độ lỏng hơn bình thường, và thường là cũng tăng số lần đi tiêu trong ngày lên một cách bất thường.



Một số biến chứng hay gặp:

Mất nước, điện giải: suy tuần hoàn, suy thận, rối loạn điện giải.

Tổn thương niêm mạc ruột: xuất huyết tiêu hóa, hội chứng kém hấp thu..

Chăm sóc người bị bệnh tiêu chảy

Vị trí bài Biên tập viên

Chủ nhật, 10 Tháng 6 2018 08:36 -

Bị n ch ng ngoài ru t: nhi m trùng huy t...

H ng d n chăm sóc t i nhà:

Cách pha ORS và u ng đúng cách: gói 1 lít nên pha đúng 1 lít n c, không chia đôi gói ra pha 2 l n. Dùng trong vòng 24h, không dùng h t thì b đi.

Ăn chín, u ng sôi, không ăn đ ôi thiu, nhi m b n...

T y u , x lý phân đúng quy trình đ tránh lây nhi m.

R a tay b ng xà phòng tr c và sau khi ăn.

S d ng ngu n n c s ch.