

Ds Đặng Thị Ngọc Hà

1. Đối với Bác sĩ kê đơn và Dược sĩ lâm sàng:

- Phải nắm vững tình trạng dùng thuốc của bệnh nhân và các bệnh mà bệnh nhân đang điều trị.
- Phải lưu ý hiệu quả của thuốc trong những trường hợp có nguy cơ như bệnh nhân già yếu, có bệnh về gan - thận, dùng nhiều thuốc đồng thời...
- Nên tránh các thuốc có nguy cơ gây tác dụng thuốc cao (Ví dụ: Cimetidin, Erythromycin, các antacid...) khi phải sử dụng nhiều thuốc hoặc trên bệnh nhân có bệnh mạn tính (như hen, tăng huyết áp, tiểu đường...)
- Nên chọn các phác đồ đơn giản, dùng thuốc ít lần trong ngày để bệnh nhân dễ thực hiện.
- Phải ghi rõ tình hình bệnh tiến triển và mục đích điều trị, phòng ngừa những điều trị để bệnh nhân dễ dàng thực hiện đúng.



Các biện pháp nhằm hạn chế phần năng suất lao động cá nhân khi sử dụng cho người cao tuổi

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 07 Tháng 7 2019 09:40 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 07 Tháng 7 2019 09:44

[Xem tiếp tại đây](#)