

**Bs Nguyễn Lê Ngọc Thảo - Khoa Nhi TM**

Các tế bào không phải là nhúng bị pháp duy nhất để kích thích sự hồi phục thông qua kích thích tính mềm dẻo của não. Có rất nhiều thuốc, trong đó có 1 số loại thông tin hoặc phần ảnh hưởng các quá trình phát triển, nhúng thúc đẩy sự hồi phục của não. Các yếu tố dinh dưỡng nhúng BDNF, yếu tố phát triển của tế bào gan (HGF), yếu tố kích thích dòng chảy tế bào và bạch cầu hệt (GM-CSF) và các thuốc khác nhúng minocyclin đã được chứng minh mang lại nhúng lợi ích trong điều trị rối loạn chức năng các nghiên cứu tiền lâm sàng và đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

Các chất ức chế phosphodiesterase 5, các loại statin và các thuốc tăng HDL và các hormone nhúng thymosin beta 4, erythropoietin và carbamylat erythropoietin được sử dụng để điều trị đột quỵ và chấn thương thần kinh, cerebrolysin, một thuốc giảm thiểu yếu tố hồi phục để với đột quỵ, cũng được sử dụng.

Cerebrolysin, một thuốc có cấu trúc peptid, là 1 loại cơ viên hàng đầu để với việc điều trị đột quỵ và chấn thương thần kinh. Nhiều phòng thí nghiệm đã chứng minh hiệu quả và độ an toàn của thuốc này trong điều trị đột quỵ thử nghiệm. Cerebrolysin hiện được đưa vào các thử nghiệm lâm sàng và sử dụng thông tin quy định nhúng nòng để điều trị đột quỵ trên lâm sàng. Cerebrolysin kích thích quá trình sinh thần kinh và tân sinh mạch trong mô hình động vật bị đột quỵ và động thái tăng cường tính mềm dẻo của não và sự hồi phục sau đột quỵ. Tiềm năng toàn bộ của thuốc này nhúng là một chất có tác dụng phục hồi để với điều trị đột quỵ và chấn thương thần kinh sẽ tiếp tục được nghiên cứu.

