

## Xét nghiệm micro albumin niệu

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 22 Tháng 8 2019 18:05 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 22 Tháng 8 2019 18:10

---

### (Định lượng MAU)

#### CN Trần Thái - Khoa Hóa Sinh

Bình thường không có các phân tử protein trong niệu, do kích thước phân tử protein lớn nên không đi qua màng đáy cầu thận. Các phân tử albumin thường đi nhờ vì vậy nhờ màng đáy cầu thận bình thường khi nó bị "rò rỉ", các phân tử albumin sẽ là các protein đầu tiên có thể đi qua màng đáy để có mặt trong niệu.

Thông thường, chỉ có một lượng rất nhỏ albumin đi qua cầu thận và được các ống thận gần tái hấp thu lại gần như toàn bộ. Vì vậy, bình thường chỉ có một lượng rất nhỏ albumin đi bài tiết qua niệu ( $< 10\mu\text{g/phút}$  hay  $< 15 \text{ mg/24 giờ}$ ).



## Xét nghiệm micro albumin niệu

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 22 Tháng 8 2019 18:05 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 22 Tháng 8 2019 18:10

---

[Xem tiếp đây](#)