

Bs Trình Trung Phong- Khoa Nội Tổng hợp

Nghiên cứu mới cho thấy: các cựu chiến binh nhận đủ liều thuốc giảm đau rối loạn số đông người (AUD) có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao gấp ba lần so với các đối chứng không có mắc chứng rối loạn số đông người. Mặc dù chứng rối loạn số đông người là mối lo ngại ngày càng tăng ở tất cả các cựu chiến binh, nhưng vấn đề rõ ràng rối loạn này có làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ ở cựu chiến binh hay không. Nghiên cứu phát hiện đã được trình bày tại đây tại Hội nghị Quốc tế Hiệp hội Alzheimer (AAIC) 2019.

Nghiên cứu cho thấy tác động của việc tiêu thụ rượu đối với nguy cơ mắc các bệnh khác nhau phụ thuộc vào liều lượng tiêu thụ. Ví dụ, theo thống kê, tiêu thụ rượu có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Tiêu thụ vừa phải làm giảm rủi ro, và số đông quá mức làm tăng đáng kể rủi ro. Điều thú vị là có thể áp dụng cho những bệnh khác nhau của việc tiêu thụ rượu liên quan đến chứng sa sút trí tuệ

"Nếu bạn uống vừa phải, điều đó có thể có tác động bảo vệ nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ, nhưng tiêu thụ quá mức có thể có tác động xấu - mặc dù điều này còn gây tranh cãi", Bahorik nói.

Sử dụng rượu u nhĩ u có thể tăng nguy cơ sa sút trí tuệ gấp ba lần

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 15:26 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 15:32

