

BS.CKI: Ngô Thị Thu Thảo -

Mòn răng là hiện tượng phá hủy mô cứng của răng do nhiều nguyên nhân như do sinh lý, tác nhân cơ học, hóa học.

Đặc điểm của mòn răng là:

- Tiến triển từ từ.
- Bệnh mất cấu trúc hàm răng hoặc cấu trúc và nhai.
- Vết mòn không bao giờ hồi phục trở lại.

1. Mòn răng sinh lý: là mòn răng do tiếp xúc giữa răng và răng trong quá trình ăn nhai. Đây là mòn răng chậm và thường xuyên, đôi khi có thể gây ra trong suốt thời gian tồn tại trên cung hàm. Vết mòn có thể mất nhai, mất tiếp xúc, bề mặt và mất trong các răng trước. Mòn răng sinh lý làm mất cấu trúc răng, kích thích thành lập ngà thay thế phần bị mất. Tuy nhiên nếu mòn răng càng nhiều. Mòn nhiều gây ê buốt hoặc viêm tủy.

2. Mòn răng do hóa học: là mất cấu trúc mô răng, do hóa chất không liên quan đến vị khuếch tán. Do tiếp xúc cấu trúc men răng với acid lâu dài, tăng giai đoạn hoặc liên tục. Các acid này có nguồn gốc từ thức ăn có chứa acid chlorhydric (như nước cam, chanh, bia, soda) hoặc thuốc hoặc do nôn mửa hoặc nôn trào ngược. Vết sang thủng có thể mất môi, má hoặc mất tiếp xúc cấu trúc các răng. Sang thủng thủng nông, rãnh, bóng láng trên bề mặt men, gần đường tiếp giáp men- cement.

[Xem tiếp tại đây](#)