

Bs Trình Trung Phong -


Theo Reuters Health: Có tới 54% bệnh nhân mắc COVID-19 phát triển bất thường về men gan trong quá trình tiến triển của bệnh, theo một đánh giá gần đây.

Suy gan đã được báo cáo ở 60% bệnh nhân mắc Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và bệnh nhân bệnh nhân nhiễm hội chứng hô hấp Trung Đông coronavirus, cả hai đều có chung trình tự bộ gen với SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2), gây bệnh COVID-19.

Bác sĩ Fu-Sheng Wang và các đồng nghiệp tại Trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia về bệnh truyền nhiễm, Bệnh Kinh, Trung Quốc đã sử dụng dữ liệu từ bảy nghiên cứu trước đây về bệnh và tại Trung tâm y tế thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc để đánh giá gan bệnh nhân nhiễm bệnh nào trong COVID-19.

Nhìn chung, 2-11% bệnh nhân mắc COVID-19 có bất thường về gan và 14-53% trường hợp COVID-19 có nồng độ alanine aminotransferase và aspartate aminotransferase bất thường trong quá trình phát triển bệnh.

Theo báo cáo trước đây của The Lancet Gastroenterology and Hepatology, bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng dường như có tỷ lệ rối loạn chức năng gan cao hơn và bệnh nhân có triệu chứng có nhiều khả năng bị tăng men gan so với bệnh nhân mắc bệnh không có triệu chứng lâm sàng.



<https://bit.ly/339Dv5h>