


Bs Huỳnh Công -

Khuyết sẹo mổ lấy thai (MLT) là sẹo mổ liên tục của niêm mạc tử cung và mô tử cung hay toàn bộ thành tử cung, xảy ra trong suốt quá trình liền sẹo MLT. Bệnh lý này được mô tả lần đầu năm 1975 trong y văn nhưng đến năm 1995 mới được H. Morris mô tả chi tiết.



Hình 1: Khuyết sẹo mổ lấy thai.

Một số thuật ngữ:

- Hở khuyết sẹo MLT (Cesarean scar defect)
- Hở sẹo MLT (Cesarean section uterine scar dehiscence)
- Bớt toàn sẹo MLT (deficient Cesarean scar)
- Thoát vòm eo TC (isthmocele)

1.Tần suất mắc bệnh

Những năm gần đây tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng tăng làm cho khuyết sẹo mổ lấy thai trở thành vấn đề phổ biến trong sản phụ khoa. Tần suất của khuyết sẹo mổ lấy thai thay đổi theo một số nghiên cứu: Fabres C (2003) chỉ ra 0,6%, Regnard C (2004) chỉ ra khoảng 3.8%, Ofili-Yebovi và cộng sự (2008) báo cáo các trường hợp mổ lấy thai cho thấy có khoảng 19.4% sẹo bớt thủng, 9.9% bớt thủng nặng (mất > 50% lớp cơ TC). Trong khi đó, Osseir OV (2009) nêu ra khuyết sẹo MLT còn gọi là hở bớt k là nguyên nhân nào chỉ ra 0.6% và Wang B (2009) cho rằng hở bớt do MLT có thể thay đổi từ 6,6% - 69%.

Khuyết sổ o m l y thai

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 18:42 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 10:38

[Xem tiếp tại đây](#)