

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh -

Theo một nghiên cứu so sánh với kết quả mang thai tại một bệnh viện ở London, tỷ lệ thai chết lưu đã tăng lên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Asma Khalil, MD, và cộng sự Đại học St George's London và các đồng tác giả đã báo cáo trong JAMA rằng sự gia tăng số thai chết lưu có thể là do các tác động gián tiếp như miễn cưỡng nhập viện khi cần thiết (ví dụ như các đồng cấp nhà thai nhi bị giam), sự nhiễm trùng hoặc không muốn thêm gánh nặng cho Dịch vụ Y tế Quốc gia" [.](#)

Để đánh giá thêm những thay đổi đối với các báo cáo về tỷ lệ thai chết lưu và sinh non trong đại dịch, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu một nghiên cứu hồi cứu với kết quả mang thai tại Bệnh viện Đại học St George ở London. Họ so sánh hai giai đoạn: từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 là giai đoạn trước COVID-19 và từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020 là thời kỳ đại dịch. Tuổi trung bình của bà mẹ khi sinh con hai thời kỳ là 33 tuổi. Thời kỳ trước đại dịch có 1.681 ca sinh và thời kỳ đại dịch có 1.718 ca sinh.

Mặc dù có ít phụ nữ sinh con so và ít phụ nữ bị tăng huyết áp hơn trong thời kỳ đại dịch, tỷ lệ thai chết lưu trong thời kỳ này vẫn cao hơn đáng kể ($n = 16$ [9/1.000 ca sinh]) so với thời kỳ trước đại dịch ($n = 4$ [2/1.000 ca sinh]) (chênh lệch, 7/1.000 ca sinh; khoảng tin cậy 95%, 1,83-12,0; $P = 0,01$). Tỷ lệ đại dịch vẫn cao hơn khi loại trừ những trường hợp hợp chủng mô tử thai kỳ muộn do bắt đầu ngừng cấp thai nhi (chênh lệch 6/1.000 ca sinh; KTC 95% 1,54-10,1; $P = 0,01$).

Tình hình thai chuyển biến trong đời dịch COVID-19

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 08 Tháng 9 2020 08:43 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 08 Tháng 9 2020 15:32

