

### Bs Nguyễn Thị Yến Linh –

Nhiễm trùng huyết là một biến chứng thường gặp ở những bệnh nhân nặng. Nhiễm trùng huyết có thể là hậu quả sau vị trí nhiễm trùng đã được xác định, nhiễm trùng tiên phát không có tiêu điểm rõ ràng hoặc từ các thiết bị nội mạch thường được sử dụng trong chăm sóc tích cực. Catheter tĩnh mạch trung tâm (CVC) là nguồn lây nhiễm phổ biến nhất qua đường máu ở những bệnh nhân nặng, và là chỉ định cho mọi bệnh xâm nhập vào máu. CVC có thể bị nhiễm trùng qua nhiều cách. Vì khuẩn có thể cư trú ở các phần trong và ngoài miệng của catheter hoặc trong lòng catheter sau đó xâm nhập vào máu. Các dụng cụ chẩn đoán tĩnh mạch bị nhiễm trùng có thể tạo ra các đợt bùng phát nhiễm khuẩn huyết hiếm gặp với các bệnh nhân không phải bệnh. Nhiễm khuẩn huyết của catheter cũng có thể xảy ra từ các vị khuẩn có nguồn gốc khác. Điều trị thành công nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter khó hơn nhiễm khuẩn huyết đơn giản, vì các sinh vật trên catheter nội mạch tồn tại trong màng sinh học mỏng, làm giảm tính nhạy cảm của chúng với liệu pháp kháng sinh và khả năng đề kháng của vật chủ, thường đòi hỏi phải rút bỏ CVC để điều trị dứt điểm.

## Nhiệm vụ trung huyết liên quan đến catheter

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 01, 23 Tháng 9 2020 11:44 - Lần cập nhật cuối Thứ 01, 23 Tháng 9 2020 21:20

