


Bs. Thái Đình Hoàng -

3 - Hydroxy - 3 - methyl - glutaryl - coenzyme là một chất ức chế men reductase, một nhóm thuốc tổng hợp đầu tiên là statin, ban đầu được phát triển để điều trị tăng cholesterol máu bằng cách ức chế bước đầu tiên trong sinh tổng hợp cholesterol ở gan, do đó làm giảm đáng kể lipoprotein vận chuyển thấp, tổng mức cholesterol, và mức độ thoái hóa mỡ, chất béo trung tính và lipoprotein mật độ cao. Bên cạnh viêm gan, nhiễm mỡ gan là một trong những phần lớn nhất có hại tới mô gan được biết đến nhiều nhất khi sử dụng statin. Nguy cơ gây hại cho gan là nhỏ, nhưng lợi ích rõ ràng trong tâm trí của các nhà cung cấp dịch vụ vì nhiễm mỡ gan là một nguồn chính gây ra sự kê đơn đầu tiên của statin trong bệnh gan mãn tính. Nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của thuốc statin trong việc giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch. Bài tổng quan ngắn gọn này sẽ giúp xóa tan quan niệm sai lầm rằng statin không an toàn trong bệnh gan mãn tính và trên thực tế, có thể có lợi cho bệnh nhân.



[Xem tiếp tại đây](#)