

Bs CK2 Lê Thị Hà -

Trẻ sinh non có nguy cơ mắc bệnh võng mạc (ROP, tức Retinopathy of Prematurity). Nghiên cứu đã chỉ ra cân nặng và tuổi thai lúc sinh thấp là 2 yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với Bệnh lý võng mạc ở trẻ. Ngoài ra còn một số nguy cơ khác như thiếu máu, suy nhiễm trùng, khó thở và bệnh tim. Bên cạnh đó, bệnh thường xảy ra ở trẻ em da trắng. Ở Mỹ, ước tính một nửa trong khoảng 28.000 trẻ sinh non mỗi năm mắc bệnh.

1. Tại sao mắc bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non?

Cơ quan hai mắt trẻ sinh non, mắt trẻ có khả năng mắc bệnh. Trẻ còn lại sẽ tiếp tục phát triển các mạch máu võng mạc như bình thường. Tuy nhiên, quá trình này sẽ kết thúc muộn hơn vài tuần so với ngày đẻ sinh ban đầu.

2. Các trường hợp bệnh võng mạc ở trẻ sinh non bị nặng có phải bị không?

Trong số 14.000 trẻ sinh non ước tính mắc bệnh lý võng mạc ở Mỹ mỗi năm, khoảng 1.100 đến 1.500 trẻ (chiếm 10%) phát triển bệnh cần can thiệp điều trị. Khoảng 400-600 trẻ sẽ sinh bệnh do bị nặng có thể chữa bệnh.


3. Bệnh võng mạc ở trẻ sinh non có thể chữa trị hay tái phát không?

Đây được gọi là giai đoạn "thoái triển" của bệnh. Và thường xảy ra ở giai đoạn đầu khi bệnh còn nhẹ (Giai đoạn 1 và 2). Ở các giai đoạn sau cũng có khả năng xảy ra. Ngay cả sau khi các mạch máu bắt đầu ngừng bị mất, các sẹo võng mạc vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Hỏi đáp về bệnh võng mạc trẻ sinh non

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 12 Tháng 6 2021 09:40 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 12 Tháng 6 2021 09:54



Mạch máu võng mạc trẻ đẻ non chưa phát triển hoàn chỉnh

Hình thành dải xơ

Dải xơ co kéo gây bong võng mạc

<https://tinyurl.com/2szuigwc>