

Viêm lợi trùm

Viết bởi Biên tập viên

Chức nhật, 19 Tháng 9 2021 09:46 - Lần cập nhật cuối Chức nhật, 19 Tháng 9 2021 09:51

Bs Nguyễn Minh Đức -

Tính chất

Phân vùng viêm khi R8 môc thối ng xãy ra ở bnh nhân tuổ i tđ 17 đđ n 25. Có thđ cđ p hay bán cđ p, nhđ ng thđ đ ng là mđ n tính (Lee và Kim).

Kích thđ đ c đ thông vào khoangg miđ ng cđ a bao mđ m răng có thđ rđ t nhđ , tuy nhiên thđ đ ng múi xa răng đ hoàn toàn trên niđm mđ c miđ ng. (hình 2-12a).

Trong giai đđ đ n xung huyđ t, vi khuđ n thđ đ ng trú trong miđ ng sđ xâm nhđ p vào toàn bđ bao mđ m, nđ u rằng không mđ c đđ đ c, khđ i đ đ ng vi khuđ n ngày càng tăng và gây nhiđ m trùng mà không thđ làm sđ ch. Khi vi trùng kđ khí phát triđ n, sđ hiđ n đđ đ n cđ a bacteroides forsythus và Porphyromonas gingivalis cho thđ y viêm nđ đ u nđ ng đ đ ng tiđ đ n triđ đ n (Blakey et al).

Khođ ng quanh răng và bao mđ m thđ đ ng đ đ n hđ đ n mđ t xa R8. Viêm bao quanh răng gây tiêu xđ đ ng theo hình đ đ đ i đ đ m đ đ c đ đ ng (hình 2-12b). Trđ c răng phđ đ n đ đ n là chiđ u đ đ ng (Punwutikorn et al). R8 chđ m hay vđ đ t lên khđ i mđ t phđ đ ng cđ đ n xđ y ra 80% đ đ đ ng hđ p. (Halverson & Anderson).

Viêm lợi trùm

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 19 Tháng 9 2021 09:46 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 19 Tháng 9 2021 09:51



[Xem tiếp tại đây](#)