

Bs CK1 Nguyễn Xuân Hiền -

1. Khái quát:

- Đây là u biểu u mô ác tính, có nguồn gốc từ nội mạc tử cung
- Ung thư nội mạc tử cung là bệnh lý phổ biến ác tính thường gặp ở các nước phát triển

2. Dịch tễ học:

- Bệnh lý ác tính phổ biến trong ung thư gặp ở các nước phát triển
- Tại Mỹ, ung thư nội mạc tử cung đứng hàng thứ 4 trong các loại ung thư xảy ra ở nữ giới, và đứng hàng thứ sáu trong các nguyên nhân tử vong ở nữ giới (cập nhật vào ngày 25/11/2020),
- Tỷ lệ ung thư nội mạc tử cung ngày càng tăng, trên thế giới đã có 382069 ca ung thư nội mạc tử cung mới trong năm 2018. Từ năm 2017 đến 2016, số ca mắc mới tăng 1% ở phụ nữ da trắng và 2% ở phụ nữ da đen.
- Hầu hết các trường hợp xảy ra ở tuổi sau mãn kinh, với độ tuổi trung bình là 60 tuổi; 67% trường hợp phát hiện ở giai đoạn sớm.

3. Sinh lý bệnh học:

Về mặt sinh lý bệnh học, ung thư nội mạc tử cung có thể chia thành 2 loại:

- Loại 1: bao gồm ung thư dạng nội mạc và ung thư biểu u mô tuyến nhầy. Loại này liên quan đến sự gia tăng estrogen trong thời gian dài dẫn đến sự kích thích tăng sinh dài dòng nội mạc tử cung. Ví dụ: sử dụng Tamoxifen trong điều trị ung thư vú; u hạt vùi bào buồng trứng; hội chứng buồng trứng đa nang...Đột biến gen PTEN, ARID1A, PIK3CA, KRAS thường gặp.
- Loại 2: bao gồm ung thư biểu u mô tuyến thành dạng, ung thư tế bào sáng, ung thư biểu u mô không biệt hóa và ung thư biểu u mô-liên kết (Carcinosarcoma). Loại này ít có mối liên quan đến estrogen. Ung thư biểu u mô tuyến thành dạng liên quan đến đột biến gen TP53

Tổng quát về ung thư biểu u mô nội mạc tử cung

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 03 Tháng 10 2021 08:32 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 03 Tháng 10 2021 08:43



[Xem tiếp ở đây](#) của ung thư nội mạc tử cung

