

Các xét nghiệm fibrinogen

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ hai, 15 Tháng 8 2022 19:11 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 8 2022 16:56


CN Huấn luyện Thứ L Minh -

I. Giới thiệu

Các khiếm khuyết fibrinogen có thể do nhúng (giảm hoặc tăng fibrinogen) hoặc do chất nhúng tính (rối loạn tiêu sợi huyết). Rối loạn chức năng Fibrinogen di truyền hiếm gặp nhưng các khiếm khuyết mức phosphoryl hóa giảm hoặc tăng, đặc biệt là trong bệnh lý còi xương, khi phân tử Fibrinogen bị glycosyl hóa quá mức làm suy giảm hoạt động của nó. Fibrinogen cũng có thể giảm trong bệnh gan do giảm tổng hợp. Tăng các sản phẩm phân hủy Fibrin (FDP) cũng làm giảm quá trình chuyển đổi Fibrinogen thành Fibrin.

Fibrinogen là xét nghiệm quan trọng cần được thực hiện khi bệnh nhân có chảy máu hoặc APTT, PT kéo dài không giải thích được. Fibrinogen tăng cao có thể liên quan với việc tăng nguy cơ huyết khối trong các nghiên cứu dịch tễ học mặc dù ý nghĩa liên quan bệnh nhân là không rõ ràng.

Cấu trúc của Fibrinogen:



Các xét nghiệm fibrinogen

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 15 Tháng 8 2022 19:11 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 8 2022 16:56

[Xem tiếp tại đây](#)