

BS Huỳnh Thị Tuyết -

Bệnh sán lá gan lợn là gì?

Bệnh sán lá gan lợn là một bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng sán lá gan lợn gây ra. Các con sán trưởng thành được tìm thấy trong đường ruột và gan của người và động vật bị nhiễm bệnh, chúng hút máu và phá hủy mô. Nhìn chung, bệnh sán lá gan lợn thường gặp ở gia súc và các động vật khác hơn là ở người.

Có hai loại sán lá gan lây nhiễm sang người. Loại chính là *Fasciola hepatica*. Một loài có liên quan khác là *Fasciola gigantica* gây bệnh chủ yếu ở động vật ăn cỏ như trâu, bò... và cũng ở người.

Bệnh sán lá gan lợn được tìm thấy ở những nơi nào trên thế giới?

Bệnh sán lá gan lợn được tìm thấy ở hơn 50 quốc gia, đặc biệt là những nơi nuôi lợn hoặc gia súc. *Fasciola hepatica* được tìm thấy ở tất cả các châu lục, ngoại trừ Nam Cực. *Fasciola gigantica* đã được tìm thấy ở một số khu vực nhiệt đới. Ngoại trừ các vùng của Tây Âu, bệnh sán lá gan lợn ở người chủ yếu được ghi nhận ở các nước đang phát triển.

Làm thế nào để con người bị nhiễm sán lá gan lợn?

Con người bị nhiễm bệnh do vô tình ăn phải (nuốt) ký sinh trùng. Điều này xảy ra chủ yếu là do ăn rau củ xoong sống hoặc các loại thực vật nước ngọt bị ô nhiễm khác. Con người cũng có thể bị nhiễm bệnh khi ăn phải nước bị ô nhiễm, chúng hút máu từ người uống nước hoặc ăn rau đã được rửa hoặc tưới bằng nước bị ô nhiễm.

