

Bs. CKI. Ngô Thị Nhật Phương -

Xạ trị là một phương pháp điều trị được sử dụng rộng rãi để quản lý ung thư biểu mô vùng đầu và cổ, nó có thể được sử dụng để điều trị để ngăn ngừa hoặc điều trị kết hợp với hóa trị. Mặc dù xạ trị hiệu quả trong việc kiểm soát các khối u ác tính, song nó cũng gây ra các tác động phụ không mong muốn trong khoang miệng. Một số tác động phụ xuất hiện ngay sau khi bắt đầu điều trị, và một số khác có thể xuất hiện sau nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau khi hoàn thành điều trị. Các biến chứng miệng của xạ trị chủ yếu là bao gồm viêm niêm mạc miệng, khô miệng, loét và giác, nhiễm nấm Candida hầu họng, sâu răng liên quan đến bệnh xạ và hoại tử xương do xạ trị.

Tất cả những biến chứng này có thể làm giảm khả năng ăn uống, nuốt và nói, dẫn đến giảm cân và thèm ăn. Những triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và thậm chí ảnh hưởng không nhỏ đến tiên lượng bệnh nhân. Các chuyên gia quản lý nha khoa phải được tham vấn trước, trong và sau khi xạ trị để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các biến chứng nghiêm trọng của các tình trạng suy nhược này.

Do đó, việc có một chuyên gia nha khoa trong nhóm ung thư bệnh nhân ung thư đầu và cổ sẽ làm giảm đáng kể tác động bất lợi của các biến chứng răng miệng và cải thiện các chức năng sống của bệnh nhân cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Xerostomia



<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books>