

Bs. Lê Nhật Nam -

I-Tổng Quan

Khí phế quản là một dạng khí nhiễm độc và nguy hiểm, có thành phần chính được cấu tạo bởi các chất. Trong tự nhiên có các loại: loại viêm mô, dị ứng, sởi và bao mô liên kết. Khí quản cấp là dạng khí quản tiếp xúc với thanh quản để khí quản ngang họng. Khí quản cấp là dạng khí quản tính từ họng đến cửa (carina) khí quản. Phần sau cùng là phế quản.

Chẩn đoán khí phế quản là một trong những chẩn đoán lâm sàng gặp nhiều nhất. Việc chẩn đoán dựa trên các triệu chứng lâm sàng, tiền sử, xét nghiệm theo nhu cầu khác nhau tùy theo mức độ: tại nhà giao thông, tại nhà lao động, tại nhà xã hội (đám chém) đều gia tăng, vì vậy chẩn đoán khí phế quản cũng có xu hướng gia tăng nhu cầu.

Tuy nhiên chẩn đoán khí phế quản do chẩn đoán chưa chính xác. Bởi vì, chẩn đoán khí phế quản lâm sàng nằm trong bệnh cảnh đa dạng nên dễ bỏ sót. Hơn nữa, những bệnh nhân có nguyên nhân do đa chẩn đoán chưa được chẩn đoán chính xác khiến cho việc điều trị lâm sàng các bệnh viện dễ xác định chẩn đoán khí phế quản.



[Xem tiếp tại đây](#)