

Tác hại hút thuốc lá đến bệnh lý loét dạ dày tá tràng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 11 2013 21:18 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 12 Tháng 11 2013 21:34

Bs Trần Thị Minh Thanh - Khoa Nội TH

Theo Công trình nghiên cứu Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Liên ngành Ngành Khuê, hiện có khoảng 50% nam giới trẻ thành phố nghiện hút thuốc lá (tổng số khoảng 17 triệu người hút thuốc lá). Với con số này, Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Thuốc lá không chỉ gây ra các bệnh nguy hiểm, thậm chí là ung thư cho người hút trực tiếp mà nó còn có nguy cơ cao cho cộng đồng người xung quanh.

Trong khói thuốc lá chứa hơn 4000 loại hóa chất. Trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khỏe, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc. Người ta chia ra 4 nhóm chính:

- Nicotine

Nicotine là một chất không màu, chuyển thành màu nâu khi cháy và có mùi thuốc khi tiếp xúc với không khí.

- Monoxit carbon (khí CO)

Khí CO có nồng độ cao trong khói thuốc lá và sẽ được hấp thụ vào máu, gắn với hemoglobine với ái lực mạnh hơn 20 lần oxy.

- Các phân tử khác trong khói thuốc lá

Khói thuốc lá chứa nhiều chất kích thích đường khí hoặc đường hô hấp.

Tác hại hút thuốc lá đến bệnh lý loét dạ dày tá tràng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 11 2013 21:18 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 12 Tháng 11 2013 21:34

