
Bs. Thụy Châu Quý, Bs. Phạm Thanh Tùng - Khoa Ngoại tổng hợp

I. Định nghĩa:

Paraphimosis là tình trạng da quy đầu tuột lên khỏi quy đầu nhưng không tuột xuống được. Đây là tình trạng cấp cứu niệu khoa.

Khác với phimosis - là không bao giờ tuột được da quy đầu khỏi quy đầu.



II. Nguyên nhân:

Thường xuyên nhất là do điều trị xảy ra sau khi kiểm tra dụng vật, đặt sonde niệu đạo hoặc là soi bàng quang. Ngoài ra còn có nguyên nhân do tự bản thân người bệnh tuy nhiên nguyên nhân này ít gặp.

III. Sinh lý bệnh:

Khi da quy đầu bị kẹt lại phía sau rãnh quy đầu sẽ giống như 1 nút thắt làm tắt nghẽn lưu thông mạch máu và hệ bạch huyết. Hậu quả là làm quy đầu bị sưng phù nề thiếu máu nuôi dưỡng.

Thiếu máu và phù nề sẽ làm đau quy đầu. Nặng hơn nữa tình trạng này kéo dài sẽ làm hoại tử quy đầu.

IV. Lâm sàng:

1. Triệu chứng cơ năng:

- Đau
- Sưng quy đầu
- Tiểu khó
- Bí tiểu

2. Triệu chúng thực thể:

- Sốt
- Quy đầu sưng to da quy đầu tạo 1 vòng thắt tại rãnh quy đầu
- Nếu tại trị quy đầu có thể hoại tử

3. Các giai đoạn:

- Giai đoạn sớm:



- Giai đoạn giữa:



- Giai đoạn trễ:



