

**Bs CKI Nguy n Đ c K - Khoa N i TH**

**1. HEN VÀ THAI NGHÉN.**

ph n b hen mà có thai, thì đ n ng c a hen đ thay đ i, di n bi n ph c t p, c n theo dõi th ng xuyên đ đ i u tr h p lý. T t c các thu c đ i u tr hen đ ng hít v i li u thông th ng đ u an toàn khi có thai. B nh hen kém ki m soát , s gây tình tr ng thi u oxy đ n đ n nguy hi m cho thai nhi.

S đ ng corticosteroid đ ng toàn thân cũng không gây nên v n đ l n, tr khi đ c dùng v i li u l n hay nhi u đ t th ng xuyên, khi đó tr ng l ng khi sinh c a tr s b gi m. Thu c kích thích beta 2 li u cao c ch c n co t cung, nh ng đ i u này ít có ý nghĩa lâm sàng n u dùng theo đ ng hít. N u có th đ c thì tránh dùng thu c theo đ ng u ng, đ c bi t thu c kích thích beta 2 tác đ ng kéo dài và theophylline.

# Xử trí ngộ độc thuốc giảm đau p hen đ c bi t

Vi t b i Biên t p viên

Th ba, 03 Tháng 12 2013 20:31 - L n c p nh t cu i Th ba, 03 Tháng 12 2013 20:41

