


Bs Đặng Thị Quỳnh Chi -

Thiếu máu là một biến chứng phổ biến của bệnh thận mạn tính (CKD), và việc quản lý thiếu máu là một yếu tố quan trọng trong thực hành thận học hiện đại. Hội đồng dẫn dắt nhót của Tổ chức Cội thiếu n Két qu Toàn c u và Bệnh thận (KDIGO) về quản lý thiếu máu ở bệnh nhân CKD được công bố vào năm 2012. Kể từ khi hội đồng dẫn dắt đó được ban hành, một số đáng thu n m nh m h n đã xuất hiện về nh ng r i ro và l i ích h n ch c a các ch t kích thích t o h ng c u (ESA), cũng nh b ng ch ng b sung đ h ng d n vi c s d ng t i i u s t tiêm tĩnh m ch (i.v.). Gần đây h n, các ch t c ch y u t gây thiếu oxy-prolylhydroxylase (HIF-PHI) đã được giới thiệu nh một l a ch n thay thế cho ESA để điều u ch nh thiếu máu ở nh ng ng i m c CKD. Tuy nhiên, v n còn nh ng đi u ch a ch c ch n về nh ng r i ro và l i ích lâu dài c a HIF-PHI so v i ESA.

Kể từ khi hội đồng dẫn dắt năm 2012 được công bố, KDIGO đã t ch c 2 H i ngh Th o lu n v qu n lý thiếu máu ở bệnh nhân m c bệnh thận. H i ngh đ u tiên (tháng 12 năm 2019) t p trung vào qu n lý thiếu máu t i i u ở bệnh nhân suy thận mạn tính (CKD) và bao g m các khía c nh nh s t, thiếu máu và k t qu ; c ch b nh sinh và ch n đoán thiếu s t và thiếu máu ở bệnh nhân CKD; s d ng các thu c b sung s t trong qu n lý thiếu máu ở bệnh nhân CKD; và tác đ ng c a ESA và các thu c đi u tr m i liên quan đ n ki m soát hemoglobin (Hb), tình tr ng s t và nhu c u b sung s t. H i ngh th hai (tháng 12 năm 2021) t p trung vào các li u pháp đi u tr thiếu máu m i ở bệnh nhân CKD, đ c bi t là các thu c c ch histamin histamin (HIF-PHI). Nh ng ng i tham gia nh t trí r ng vi c c p nh t h ng d n năm 2012 là c n thi t và k p th i.



[Xem tiếp tại đây](#)