

CN. Nguyễn Hữu Ánh – Khoa CĐHA

1. Giới thiệu

Khớp vai là khớp ball-and-socket phức tạp nhất trong cơ thể và chiếm khoảng 50% tổng số các chấn thương khớp. Trượt khớp vai là một chấn thương phổ biến trong khoa cấp cứu. Trong khi trợt khớp vai ra trợt cổ tay phức tạp và thường gặp, trợt khớp vai dưới (Inferior shoulder dislocation) có thể ít gặp hơn trong tổng số các chấn thương khớp vai.

Trượt khớp vai dưới (Inferior shoulder dislocation) thường được gọi với tên luxatio erecta hay luxatio erecta humeri, có nghĩa là "trượt khớp vai xuống" trong tiếng La-tinh. Tên này bắt nguồn từ cách thức điển hình mà cánh tay thường được đưa ra hoàn toàn và giữ trên đầu khi bệnh nhân thức.

Trượt khớp vai dưới (Luxatio Erecta) được mô tả lần đầu tiên vào năm 1859. Đây là chấn thương hiếm gặp (khoảng 0,5% các chấn thương khớp vai), đặc trưng bởi tình trạng chèn ép xương cánh tay bên dưới xương dưới vòm, khiến cánh tay biến dạng như nhân bịt cổ họng và thường giữ thẳng đứng đã lên đến đầu.

2. Giới thiệu khớp vai

Khớp vai là khớp quan trọng trong hoạt động. Khả năng chuyển động khớp vai lớn hơn các khớp khác. Tuy nhiên, khớp không vững chắc so với các khớp khác do bề mặt tiếp xúc nhỏ và nông so với chèn ép xương cánh tay.

Hình ảnh trắ khắ p hiắ m gắ p

Vị tắ bắ i Biế tắ p viế

Thắ năm, 28 Thắ 5 2026 09:03 -



1. Môm cùg đờn; 2. Môm cùg vai; 3. Máu đờg lờ;
4. Chờm xờng cắg tay; 5. Môm quạ; 6. Ổ cháo

[Xem tắ p tắ i đắ](#)