

Đánh giá đường thở trong gây mê

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 24 Tháng 3 2021 18:24 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 24 Tháng 3 2021 18:27

BS H^o Kiến Phát -^o

I/ Tổng quan

Đường thở khó là nguyên nhân quan trọng nhất của biến chứng và tử vong liên quan đến thủ tục mê. Khoảng 30% trường hợp tử vong do gây mê có liên quan đến quản lý đường thở không đầy đủ.

- Hậu quả của các thảm họa là do khó khăn bất ngờ hoặc do lập kế hoạch kém với các trường hợp đường thở khó
- Đánh giá đường thở theo truy cập thông tin trung để đoán nhúng vào nội soi thanh quản
- Quan trọng không kém là để đoán tình trạng thông khí khó, sắp xếp các thiết bị hỗ trợ (SAD) và các kỹ thuật cứu hộ khác
- Khó thông khí bằng mặt nạ trong khoảng 1:20 trường hợp và không thể trong 1:50 trường hợp
- Khó đặt nội khí quản trong khoảng 1:50 trường hợp và không thể trong 1:2000 (1:300 với trường hợp cấp cứu)
- Các kỹ thuật cấp cứu không thành công trong khoảng 1:20 trường hợp
- Các biến chứng có nguy cơ tử vong để đoán khó khăn hoặc nguy cơ hạ oxy máu nhanh chóng (vd: mang thai, béo phì, trẻ em) cần được chăm sóc cẩn thận
- Tiền sử, khám và nghiên cứu phải đánh giá các rủi ro về đường thở, thông khí và oxy, không chỉ các trường hợp khó nội soi thanh quản.



[Xem tiếp tại đây](#)