


Bs Nguyễn Thị Tuấn -

Tổng quan

Dày niêm mạc tử cung phát hiện sau mãn kinh không có triệu chứng thường đi kèm bài toán khó về quản lý lâm sàng. Mặc dù tỷ lệ mắc ung thư niêm mạc tử cung tăng đáng kể nhưng phần lớn không có triệu chứng chảy máu, nhưng việc đi tìm có kết quả tốt nhất khi được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Đối tượng hiện tại cho thấy một số nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư niêm mạc tử cung bao gồm các dấu hiệu nguy cơ trên siêu âm (tăng sinh mô chày máu, dày niêm mạc tử cung không đồng nhất, tăng độ chày lòng tử cung, dày niêm mạc tử cung quá mức $>11\text{mm}$; và / hoặc các yếu tố nguy cơ mắc ung thư niêm mạc tử cung như sử dụng tamoxifen, béo phì, tăng huyết áp và mãn kinh muộn.

Việc áp dụng các khuyến nghị này có thể làm giảm lo lắng, đau đớn và nguy cơ biến chứng về thủ thuật nhưng bênh nhân mãn kinh.



[Xem tiếp đây](#)