

Thuốc chống huyết khối quanh phẫu thuật ngoài tim

Vị trí bài Biên tập viên

Chủ nhật, 29 Tháng 6 2025 08:41 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 29 Tháng 6 2025 08:48

BS. Trần Quốc Bảo -

1. ĐỐI CỐI NG

Theo Hiệp hội bác sĩ Nội khoa Hoa Kỳ (ACCP) 2022, chu phẫu (perioperative period) là thuật ngữ để chỉ khoảng thời gian trước và sau phẫu thuật (PT), thời gian (TT), kéo dài từ 1 tuần trước khi PT cho đến 4 tuần sau khi PT, TT. Thời gian 5 tuần quanh PT, TT này để xem là khoảng thời gian để xem xét ra các biện pháp liên quan đến huyết khối hoặc chảy máu liên quan đến sử dụng thuốc chống huyết khối

Thuốc chống huyết khối bao gồm thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc tiêu sợi huyết và thuốc chống đông. Việc quản lý thuốc chống huyết khối chu phẫu dành cho các đối tượng sử dụng kháng vitamin K (VKA), thuốc chống đông đường uống trực tiếp (DOAC) hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu mà phải thực hiện phẫu thuật hoặc các thủ thuật xâm lấn.

DOAC	Ngày vor chảy máu	Ngừng DOAC trước PT				Tái sử dụng sau PT			
		Day -6	Day -4	Day -3	Day -2	Day -1	Day +1	Day +2	Day +3
Apixaban	High	→				←			
	Low/Mod	→				←			
Dabigatran (DO > 90 mg/kg)	High	→				←			
	Low/Mod	→				←			
Dabigatran (DO < 90 mg/kg)	High	→				←			
	Low/Mod	→				←			
Edoxaban	High	→				←			
	Low/Mod	→				←			
Rivaroxaban	High	→				←			
	Low/Mod	→				←			

Ngày phẫu thuật, thủ thuật (DO)

Ngày DOAC

[Xem tiếp tại đây](#)