

## **BSCKII. Tràn Quốc Chiên - Trung tâm Ung bướu**

### **PHẦN 2. Điều trị ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn sớm [BCLC 0-A] và trung gian [BCLC B]**

#### **MẬT SƯ CÁC KHUYẾN NGHỊ HIỆN NAY**

(1) Quy trình lý bởi nhóm đa chuyên khoa (MDT – Multidisciplinary Team) được khuyến nghị mạnh mẽ cho bệnh nhân HCC giai đoạn sớm và trung gian [II, A].

(2) Cắt gan được khuyến nghị cho bệnh nhân có mật khối u đơn độc > 2 cm và không có bằng chứng tăng áp tĩnh mạch cửa (BCLC 0 đến A) [II, A].

(3) Cắt gan được khuyến nghị cho bệnh nhân có chức năng gan Child-Pugh A, không có tăng áp tĩnh mạch cửa đáng kể hoặc các chứng chỉ khác [III, A].

(4) Cắt gan có thể được cân nhắc cho bệnh nhân được chọn lọc kỹ, có chức năng gan Child-Pugh B đến nhẹ và/hoặc mật độ tăng áp tĩnh mạch cửa nhẹ với sự cân nhắc cẩn thận nguy cơ mất bù [III, B].

(5) Cắt gan được khuyến nghị như một lựa chọn cho bệnh nhân HCC giai đoạn trung gian (BCLC B) không phù hợp với các liệu pháp trong điều trị mạnh [II, A].

(6) Bệnh nhân xơ gan, phình giãn tĩnh mạch cửa xâm lấn thì ưu tiên được khuyến nghị [III, A].

(7) Điều trị bằng vi sóng (MWA – Microwave Ablation) hoặc điều trị bằng sóng cao tần (RFA –

Radiofrequency Ablation) để điều trị khuynh ngh trong HCC giai đoạn rớt sớm (BCLC 0) [II, A].

(8) MWA hoặc RFA để điều trị khuynh ngh nh mớ t l a ch n thay thế cho phẫu thuật cắt gan ở bệnh nhân HCC giai đoạn sớm (BCLC A) [II, A].

(9) Việc l a ch n giữa cắt gan hay đ t u c n xem xét các giới hạn kỹ thuật và ph i đ c th o l u n b i MDT [III, A].

(10) MWA hoặc RFA có thể để điều trị khuynh ngh cho các khối u đ n đ c có đ ng kính 3–5 cm hoặc b nh đa ( ≤ 3 khối u, m i khối ≤ 3 cm) (BCLC A) nh ng b nh nh n không ph i là ng viên cho phẫu thuật cắt gan hoặc nh mớ t ph ng án b c c u cho ghép gan toàn b đúng v trí (OLT – Orthotopic Liver Transplantation) [II, B].


(11) Điều trị toàn thân b tr b ng thu c c ch tyrosine kinase (TKIs – Tyrosine Kinase Inhibitors) hoặc các phác đ ph i h p đ a trên thu c c ch đi m ki m soát miễn d ch (ICI – Immune Checkpoint Inhibitors) sau phẫu thuật cắt gan hoặc đ t u không đ c khuynh ngh [I, E].

## Ung thư biểu mô tế bào gan (tt)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 06, 06 Tháng 5 2026 20:19 - Lần cập nhật cuối Thứ 06, 06 Tháng 5 2026 20:36

---



[Xem tiếp tại đây](#)