


### Bs Phan Tụn Kịt –

U mô tḥa (hamartoma) là nḥng kḥi u lành tính có tḥ phát trịn ở nḥu c̣ quan khác nhau, bao g̣m pḥi, tḥn, da và vú. U mô tḥa ở vú cḥa bịu mô tuỵn, mô ṃ và mô x̣ ṿi ṭ ḷ khác nhau. U phát trịn cḥm và kích tḥc khác nhau, ṭ nḥng kḥi nḥ đ̣n nḥng kḥi u có đ̣ng kính 10–12 cm, có tḥ chịm g̣n nḥ toàn ḅ vú. U mô tḥa chịm 4–8% các ṭn tḥng lành tính ở vú đ̣c cḥn đoán ở pḥn [2], có đ̣n 60% không có trịu cḥng lâm sàng, ṃt ṣ có bịu hịn lâm sàng rõ ràng khi thăm khám đ̣i đ̣ng các kḥi u ṃm, tròn học hình ḅu ḍc, có ḅ ṃt nḥn và di đ̣ng so ṿi các mô xung quanh [3]. Vịc ṣ đ̣ng ngày càng nhịu pḥng pháp cḥp nhữ nḥ sàng ḷc đã đ̣n đ̣n ṣ gia tăng cḥn đoán u mô tḥa ở vú [1].


Bịu hịn hình nḥ siêu âm c̣a u mô tḥa vú ṛt khác nhau do ṣ thay đ̣i ṿ hàm ḷng mô ṃ và mô x̣, đa pḥn có đ̣ng các kḥi đ̣c, rõ nét, hình ḅu ḍc ṇm song song ṿi ṃt pḥng da. C̣u trúc không đ̣ng nḥt ṿi các vùng gịm âm xen ḷn ṿi các vùng tăng âm đ̣ng đ̣i học đ̣ng ṇt, pḥn ánh ṣ hịn dịn c̣a mô ṃ, bịu mô và mô liên ḳt x̣ (Hình 1). Không có hịn ṭng tăng sinh ṃch máu trên hình nḥ Doppler màu. Cḥn đoán có tḥ khó khăn khi kḥi u nḥ, hàm ḷng ṃ tḥp và ṿ gị không hoàn cḥnh. U mô tḥa có ḷng mô ṃ đáng ḳ đôi khi gịng ṿi u ṃ [1].



## U mô th ả tuy ến v ớ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 08 Tháng 7 2026 16:01 -



**မိသားစုဝင်များ၏အကျိုးခံစားခွင့်**

U mô th a tuy n vú

Vi t b i Biên t p viên  
Th t , 08 Tháng 7 2026 16:01 -

