

BSCKI. Nguyễn Trung Hiếu -

1. ĐỊNH NGHĨA

Viêm tủy xương là tình trạng nhiễm trùng xương do vi khuẩn hoặc các vi sinh vật khác gây ra. Trẻ em, đặc biệt là trẻ em, dễ bị nhiễm trùng xương, đặc biệt là trong các trường hợp không có triệu chứng rõ ràng hoặc có triệu chứng ho hoặc đau ở vùng xương bị tổn thương. AHO thường xuất hiện ở trẻ em có triệu chứng và có thể tiến triển nhanh nếu không được nhận biết và điều trị kịp thời.

AHO là một bệnh nhiễm trùng xâm lấn tiến triển nhanh chóng, có thể gây biến chứng đáng kể và thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh này có thể dẫn đến viêm tủy xương mãn tính, tái phát, rối loạn tăng trưởng hoặc tàn tật.

Điều khó trong thực hành là bệnh nhân ban đầu có thể không có triệu chứng rõ ràng. Trẻ có thể chỉ đau một vùng chi, đi khập khiễng hoặc không chịu vận động chi. Sốt có thể không rõ ràng và X-quang giai đoạn sớm thường chỉ có biến đổi mờ nhạt. Chính vì vậy, AHO cần được phát hiện sớm trong chẩn đoán phân biệt trẻ có đau xương khu trú không gặp thích nghi, đặc biệt khi kèm sốt hoặc bệnh nhân đang.

Trong những năm gần đây, chẩn đoán và điều trị AHO đã có nhiều thay đổi. Hướng dẫn PIDIS/IDSA năm 2021 nhấn mạnh vai trò của MRI, xét nghiệm PCR để chẩn đoán nhiễm trùng, điều trị kinh nghiệm có cân nhắc MRSA và đặc biệt là chuyển sang kháng sinh tĩnh mạch sang điều trị ngoại trú bệnh nhân ổn định.



Viêm tỵ x huyết đường máu cấp tính ở trẻ em

Viết bởi Biên tập viên
Thứ ba, 25 Tháng 8 2026 14:21 -

[Xem tiếp tại đây](#)