

Ths Lê Văn Tuấn - Khoa ICU

Các nhà nghiên c u B c nh báo: H n m t ph n ba s ph n mang thai b thi u s t, đ t h vào nguy c gia tăng b nh lý tuy n giáp, s làm tăng kh năng x y ra các bi n ch ng khi mang thai nh s y thai.

Các nghiên c u đ c công b tr c tuy n trong *T p chí N i t Châu Âu* vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, ch ra r ng 35% c a 2000 ph n có thi u s t trong 3 tháng đ u mang thai, và đ u này làm tăng nguy c h n 50%.

Trong khi các nghiên c u tr c đây ch ra r ng thi u s t khi mang thai có th nh h ng t 24% đ n 44% s ph n , thì đây là l n đ u tiên cho th y các hi u ng ph c a m t t l tăng b nh tuy n giáp t mi n.

Tác gi chính Kris G Poppe, MD, PhD, Tr ng Phòng khám n i ti t, B nh vi n Đ i h c CHU St-Pierre, Brussels, B , nói v i Medscape Medical News r ng phát hi n này r t quan tr ng vì b nh tuy n giáp t mi n ph n mang thai làm tăng nguy c s y thai, sinh non, và cân n ng s sinh th p h n so v i ph n không b nh h ng.

Tình trạng dinh dưỡng sắt trong thai kỳ liên kết với bệnh suy n giáp

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 30 Tháng 7 2016 09:38 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 30 Tháng 7 2016 10:37



<http://www.medscape.com/viewarticle/866767>