

Phác đồ gây mê trên bệnh nhân tăng huyết áp

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ hai, 04 Tháng 6 2018 06:34 -

Bs CKI Đặng Văn Truyền - Khoa Gây mê phẫu thuật

$HA = L \times \text{tần số tim (LLT)} \times \text{Số c c n m ch máu ngo i biên (SCMMNB)}$.

Vì vậy, tăng HA do tăng LLT hoặc/và tăng SCMMNB

Tăng HA không chỉ gây ra những biến loạn hệ thống tuần hoàn mà còn dẫn đến những tổn thương ở các cơ quan đích (tim, não, mắt, thận...).

Phát hiện và đánh giá để loại trừ các yếu tố nguy cơ bằng cách điều trị nên để bệnh nhân tăng HA trước phẫu thuật có chuẩn bị hoặc tìm biện pháp xử trí và dự phòng các biến chứng do tăng HA mà phải phẫu thuật cấp cứu.

Huyết động chu phẫu

Kích thích a-adrenergic

Thừa TTTH

Thiếu TTTH
Loạn nhịp tim

THA ± Phì đại
thất trái

HA cao
Phù phổi

Giảm LLT

Giãn mạch

Tụt HA

Thiếu máu cơ tim
TBMM não

[Xem toàn bộ tài liệu](#)