

Khoa Phẫu thuật nhi khoa

1. Những biến chứng thường phát sau phẫu thuật cắt cuống chi trên hình móm cút:

Đau:

+ Đau ở khúc cuống: có thể do những nguyên nhân như xử lý thần kinh không đúng mà tạo ra tổn thương thần kinh, sẹo vết mổ không đúng thì lên vết trí chườm lạnh. Để khắc phục phải ghi nhớ quy trình đúng nguyên nhân.

+ Đau chi ma: vết mổ trên ngón háp NB còn có cảm giác đau ở phần chi đã cắt bỏ. Khắc phục tình trạng này bằng liệu pháp tâm lý đối với NB

Chảy máu móm cút: do cảm máu không triệt để, tuột chốt thắt mạch máu, chảy máu đầu xương hoặc do va đập vào đầu móm cút. Để khắc phục có thể băng ép, chườm lạnh hay massage.

Chăm sóc mổ mổ cố tố sau cố tố cuố tố chi

Viết bên iên tập viên

Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 20:59 -



Viết bên iên tập viên
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 20:59 -
Đang chờ phản hồi của bác sĩ chuyên gia để có thể tiếp tục thảo luận và giải đáp thắc mắc của bạn.