

Giảm tỉ lệ tử vong do suy tim do truyền máu khi lưu trữ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 22:21 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 07:40

Truyền máu khi lưu trữ (TMKLL) là truyền máu từ người cho 3000ml máu và chỉ phải mất máu trong vòng 24 giờ cho cùng một người bệnh. Đây là một phương pháp điều trị hiệu quả trong những trường hợp mất máu cấp hay các phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Tuy nhiên, máu lưu trữ lâu hay thời gian dài các yếu tố đông máu và các chất hóa học trung gian và các enzyme (giải phóng ra trong quá trình bảo quản và lưu trữ máu) nên khi truyền cho người bệnh với số lượng nhiều có thể gây ra những rối loạn đông cầm máu. Giảm số lượng tử vong do suy tim do truyền máu cũng là một trong những biện pháp giúp giảm tỷ lệ tử vong do truyền máu khi lưu trữ.



Giảm số lượng tử vong do suy tim do truyền máu khi lưu trữ thông qua do máu lưu trữ không còn tử vong, do hòa loãng máu hay do các chất thải tích tụ.

Nghiên cứu trên 30 người bệnh (13 nam và 17 nữ) truyền máu khi lưu trữ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam từ tháng 10/2010 đến tháng 09/2012, chúng tôi nhận thấy số lượng tử vong

Giảm tỉ lệ tử vong do suy tim cấp do suy tim cấp do suy tim cấp

Viết bởi: Biên tập viên

Thủ năm, 14 Tháng 3 2013 22:21 - Lần cập nhật cuối: Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 07:40

Các nghiên cứu khác biệt ($p < 0,01$) ở các hai thời điểm T1 (Ngay sau TMKLL) và T2 (24h sau TMKLL) so với thời điểm T0 trước suy tim cấp. Một nghiên cứu của Nguyễn Thị Huệ và Đồng Trung Phấn năm 2008 cũng cho kết quả tương tự.

Điều trị giảm tỉ lệ tử vong do suy tim cấp do suy tim cấp do suy tim cấp chủ yếu dựa trên các thuốc điều trị suy tim cấp, các thuốc này vừa bổ sung tim mạch và các yếu tố đông máu, vừa hạn chế được tình trạng giảm tỉ lệ tử vong do hòa loãng máu; do đó, hạn chế các rủi ro đông chảy máu nói chung và các tai biến của nó.

ThS. BS. Phạm Thị Vĩnh